

## **Ενδεικτική απάντηση**

### **2.1**

α) Να αναφερθούν έξι (6) από τους ακόλουθους τύπους ακμής:

- φαγεσωρική ακμή
- βλατιδοφλυκταινώδης ακμή
- ακμή από καλλυντικά
- ακμή από λήψη φαρμάκων
- νεογνική ακμή
- κυστική ακμή
- επαγγελματική ακμή
- κεραυνοβόλος ακμή
- προκλητή ακμή

β) Η αντιμετώπιση του ακνεϊκού δέρματος (ειδικά σε φλεγμονώδη φάση) θα πρέπει να γίνεται από δερματολόγο με ειδικό πρωτόκολλο φαρμακευτικής αγωγής. Η συνεργασία όμως του/της αισθητικού με τον υπεύθυνο ιατρό (δερματολόγο) κρίνεται απαραίτητη, ειδικά σε συγκεκριμένους τύπους ακμής όπως η φαγεσωρική και η βλατιδοφλυκταινώδης ακμή.

### **2.2**

α) Αποτελούνται από κερατίνη, σμήγμα, μελανοκύτταρα και τρίχες.

β) Υπάρχουν δύο κατηγορίες φαγεσώρων: οι ανοικτοί και οι κλειστοί.

Στους ανοικτούς φαγέσωρες η εικόνα τους οφείλεται στην ύπαρξη μελανίνης και στην οξείδωση της επιφάνειάς τους από τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Οι κλειστοί είναι μικρά επάρματα στο χρώμα του δέρματος.