

Ενδεικτικές απαντήσεις

Θέμα 2^ο

2.1

α) Μετεγχειρητικές δυσχέρειες.

- Πόνος.
- Δίψα.
- Δυσφορία.
- Ναυτία – έμετος.
- Δυσκοιλιότητα.
- Επίσχεση ούρων.

β)

- Δημιουργεί ήρεμο και άνετο περιβάλλον. Αφήνει τον άρρωστο να εκφράσει τις ανησυχίες του.
- Χορηγεί αναλγητικά.
- Τον τοποθετεί σε αναπαυτική θέση.
- Χαλαρώνει την περίδεση του τραύματος, αν είναι σφικτή.
- Ενθαρρύνει τον άρρωστο να παίρνει βαθιές αναπνοές, για να αποβάλει το αναισθητικό.
- Χορηγεί αντιεμετικά.
- Γυρίζει το κεφάλι του αρρώστου στο πλάι, αν κάνει εμετό.
- Κάνει συχνή αναρρόφηση από το ρινογαστρικό σωλήνα.
- Εφαρμόζει σωλήνα αερίων για 10–20 λεπτά, αν χρειαστεί.
- Ανοίγει τη βρύση ή ρίχνει χλιαρό νερό στο περίνεο, για τη φυσιολογική ούρηση.
- Ελέγχει τις παροχετεύσεις.
- Χορηγεί προοδευτικά τροφή, που αυξάνει τον περισταλτισμό του εντέρου.

(Απαιτούνται πέντε από τα παραπάνω)

2.2

Κυριότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι:

- Καταπληξία ή shock.
- Αιμορραγία.
- Φλεβίτιδα–θρομβοφλεβίτιδα.

- Λιποθυμία.
- Γαστροπληγία.
- Ατελεκτασία.
- Παραλυτικός ειλεός.
- Επιπλοκές από το τραύμα.