

Ενδεικτικές απαντήσεις

2.1

Τα μέσα αυτά είναι:

- Στα βαριάς μορφής οξέα Α.Ε.Ε. χρειάζεται να δοθεί οξυγόνο στον ασθενή εξωτερικά.
- Στα εμβολικά-ισχαιμικά Α.Ε.Ε. πιθανώς χρειάζεται να γίνει αντι-θρομβωτική θεραπεία με θρομβολυτικά φάρμακα.
- Σε περιπτώσεις αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης και οιδήματος του εγκεφάλου μπορεί να γίνει είτε συντηρητική αγωγή (φάρμακα) είτε χειρουργική.

2.2

Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τρεις (3) από τους παρακάτω στόχους της επείγουσας ιατρικής αντιμετώπισης των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (Α.Ε.Ε.) που έχει να κάνει με την διατήρηση του ασθενή στη ζωή.

- 1) Έλεγχος και παρακολούθηση της νευρολογικής κατάστασης του ασθενή.
- 2) Έλεγχος και παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών.
- 3) Έλεγχος και παρακολούθηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα και διόρθωση τους σε περίπτωση που αυξάνουν ή ελαττώνονται σημαντικά (υπεργλυκαιμία ή υπογλυκαιμία).
- 4) Έλεγχος και παρακολούθηση της θερμοκρασίας του σώματος και διόρθωσή της σε περίπτωση που αυξάνει (πυρετός).
- 5) Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και αγωγή με κατάλληλα φάρμακα.