

Ενδεικτικές απαντήσεις

2.1

α) Ζητούνται τέσσερις (4) από τους παρακάτω προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση Ισχαιμικού Α.Ε.Ε.:

- Ηλικία
- Υπέρταση
- Υπερλιπιδαιμία
- Σακχαρώδης διαβήτης
- Καρδιακές βλάβες
- Διαταραχές πήξης του αίματος
- Κάπνισμα

β) Ζητούνται τέσσερις (4) από τους παρακάτω προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση Αιμορραγικού Α.Ε.Ε.:

- Κάπνισμα
- Αλκοόλ
- Υπέρταση
- Ανωμαλίες στο τοίχωμα των αγγείων
- Αντισυλληπτικά χάπια
- Χρήση απαγορευμένων ουσιών
- Έλλειψη φυσικής δραστηριότητας
- Παχυσαρκία

2.2

Η αντιμετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (Α.Ε.Ε.) μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη:

- Στην επείγουσα ή άμεση ιατρική αγωγή που έχει να κάνει συνήθως με την διατήρηση του ασθενή στη ζωή.
- Στην αποκατάσταση που στοχεύει να διορθώσει τα επακόλουθα του Α.Ε.Ε.