

## **Ενδεικτικές απαντήσεις**

### **2.1**

α) Η πνευμονική εστία, που παρατηρείται στις ακτινογραφίες, μαζί με τους διογκωμένους λεμφαδένες στις πύλες των πνευμόνων αποτελούν το πρωτοπαθές σύμπλεγμα της πνευμονικής φυματίωσης.

β) Το πρωτοπαθές σύμπλεγμα της πνευμονικής φυματίωσης συχνά θεραπεύεται από μόνο του και περιορίζεται, κλεισμένο σε «κέλυφος» ασβεστίου.

γ) Αν η άμυνα αποτύχει να αντιμετωπίσει το πρωτοπαθές σύμπλεγμα της πνευμονικής φυματίωσης γίνεται διασπορά του στον υπόλοιπο πνεύμονα και σε άλλα όργανα .

### **2.2**

α) Η εγκατάσταση του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης σε τραχηλικούς λεμφαδένες, ονομάζεται τραχηλική φυματιώδης λεμφαδενίτιδα.

β) Η φυματιώδης μηνιγγίτιδα μπορεί να εκδηλωθεί σε εξασθενημένα άτομα και βρέφη.

γ) Η εγκατάσταση μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης σε άλλα όργανα (νεφρούς, έντερο) είναι πολύ σπανιότερη και

δ) γίνεται πολλά χρόνια μετά την αρχική πνευμονική εντόπιση.