

Ενδεικτική επίλυση

4.1

α) Οι κινητικές διαταραχές που είναι δυνατό να εμφανίζει είναι παραπληγία, μονοπληγία ή ημιπληγία.

β) Σε βλάβη της παρεγκεφαλίδας θα εμφανίζει συμπτώματα αταξίας, δηλαδή διαταραχή στη βάδιση, με τρόμο των χεριών και ποδιών στις εκούσιες κινήσεις, και μυϊκή ασυνεργία-αδιαδοχοκινησία, δηλαδή το σταμάτημα του ασθενούς πιο πριν ή λίγο μετά τον στόχο του, όταν εκείνος προσπαθεί να κάνει μια κίνηση.

γ) Η ομιλία γίνεται μονότονη ή «σκοντάπτουσα ομιλία».

4.2

Συχνά ο ασθενής έχει ακράτεια ή νιώθει το αίσθημα επιτακτικής ούρησης. Επίσης, μπορεί ένα μέλος του σώματός του να είναι σε σύσπαση και να υπάρχει ταυτόχρονα και πόνος χωρίς διαταραχή της συνείδησης. Μπορεί ακόμα να γελά συνεχώς και χωρίς λόγο ή να κλαίει αναίτια. Προοδευτικά θα υπάρχει και μείωση της μνήμης και νοημοσύνης του. Σημαντικό είναι επίσης το αίσθημα κόπωσης, που νιώθει σχεδόν συνεχώς, καθώς και η μυϊκή αδυναμία.