

Ενδεικτικές απαντήσεις

2.1

α) Ο εξεταζόμενος τοποθετείται ύπτιος με τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα, αντίστοιχα με την πραγματοποίηση ΠΟ ακτινογραφίας Ο.Μ.Σ.Σ., ώστε να διευκολυνθεί η διάνοιξη των διαστημάτων μεταξύ των σπονδύλων.

β) Λαμβάνεται πλάγιο τοπογράφημα βάσει του οποίου ορίζεται η απαιτούμενη κλίση ανά διάστημα ώστε η δέσμη να είναι παράλληλη με τη διεύθυνση των μεσοσπονδύλιων δίσκων και να διευκολύνεται η εκτίμηση πιθανής στένωσης του μεσοσπονδύλιου διαστήματος.

2.2

α) Εκλεκτικός έλεγχος κάποιου από τα όργανα της κοιλίας γίνεται συνήθως για χαρακτηρισμό ή παρακολούθηση αλλοιώσεων - όγκων του συγκεκριμένου οργάνου.

β) Χορηγείται σκιαγραφικό και λαμβάνονται λήψεις κατά συγκεκριμένα διαστήματα μετά τη χορήγησή του. Μια τέτοια εξέταση σε περισσότερες από μια φάσεις μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη λειτουργία ενός ιστού βάσει του τρόπου που το σκιαγραφικό κινείται σε αυτόν σε σχέση με τους γύρω ιστούς.